

Vacina contra a Leishmaniose canina - Canileish

A Leishmaniose canina é causada por um parasita, *Leishmania* sp, transmitido através da picada de flebótomos. Estes insectos encontram-se amplamente disseminados sendo encontrados em diversos habitats, inclusivamente em Portugal. O nosso país é hoje em dia considerado já uma zona endémica (muito afectada) com uma prevalência (número de casos) muito elevada.

A Leishmaniose atinge principalmente os cães sendo que outros animais, inclusivamente o ser humano, podem também ser afectados. No entanto, não existe a possibilidade de transmissão directa de um animal infectado aos seres humanos, sendo que esta passa sempre pela picada dos mosquitos. A incidência da doença no Homem é baixa em indivíduos saudáveis.

Embora os tratamentos permitam controlar os sintomas da infecção no seu animal, não curam a doença sendo esta frequentemente mortal.

Não é possível ainda a prevenção a 100%. No entanto, além dos produtos existentes no mercado que ajudam a diminuir a probabilidade de contrair o parasita, está já disponível actualmente uma vacina contra a Leishmaniose canina com cerca de 93% de eficácia.

O novo plano de vacinação eleva o patamar de protecção do seu cão garantindo que o seu sistema imunitário estará preparado para resistir à doença. Tal como em qualquer outra vacina a eficácia não é de 100% pelo que todos os outros métodos de prevenção não devem nunca passar para segundo plano. O programa completo inclui 3 doses administradas com 3 a 5 semanas de intervalo sendo necessário depois apenas uma revacinação anual para manter a protecção.

A vacinação está indicada em cães com idades superiores a 6 meses, desparasitados e saudáveis. É sempre necessária a realização de um teste serológico para diagnóstico da doença antes do início deste protocolo, uma vez que animais portadores não devem ser vacinados. É importante realçar que se o seu animal estiver infectado os sintomas podem, por vezes, não ser detectados de imediato, daí a obrigatoriedade da realização do teste.

Tal como em qualquer vacina existe a possibilidade de reacções adversas e inesperadas, podendo estas surgir até 15 dias após a administração. As mais frequentes são febre, apatia, diminuição do apetite, diarreia, vómitos, dor, vermelhidão, inchaço na zona da aplicação.

Este programa vacinal, há muito aguardado, permite uma redução eficaz, segura e duradoura do risco de o seu animal desenvolver a doença.

Para outros esclarecimentos contacte o seu veterinário e leia o pdf Leishmaniose no nosso site na secção informações úteis – saber mais sobre – Leishmaniose .

Clínica Veterinária do Laranjeiro, 26 de Maio de 2011

Visite-nos em www.clinicaveterinariadolaranjeiro.com.pt